

Anleitung für Patienten

Einnahme von MOVIPREP vor der Darmspiegelung

Bei Ihnen ist am _____ um _____ Uhr eine Spiegelung
des Dickdarmes vorgesehen.

Bitte finden Sie sich **30 Minuten eher** in unserer Praxis ein.

Zur Untersuchung bitte mitzubringen:

- Medikamentenplan
- Aufklärungsbögen (bitte mit Namen versehen)
- 2 große Handtücher
- locker sitzende Oberbekleidung (Armbeuge muss frei zugänglich sein)
- evtl. etwas zu Essen und Trinken für danach

Eine zuverlässige und sinnvolle Untersuchung des Darmes ist nur möglich, wenn der Darm vollständig gereinigt ist. Wir bitten Sie deshalb, die folgende Anleitung sorgfältig zu lesen und einzuhalten, denn nur dann ist eine einwandfreie Beurteilung der Darmschleimhaut möglich und eine Wiederholungsuntersuchung zu vermeiden.

Vorbereitung zur Darmspiegelung:

1. Nehmen Sie an den letzten 3 Tagen vor der Untersuchung keine Nahrungsmittel mit hohem Ballaststoffanteil oder Pflanzenkernen zu sich: z.B. Vollkornprodukte, Jogurt mit Körnern, Rohkost, Spargel, Weizenkleie, Leinsamen, Nüsse, Weintrauben, Tomaten, Paprika, Kiwi.
Sollten Sie Eisenpräparate nehmen, setzen Sie diese 3 Tage zuvor ab.
2. Trinken Sie am Tag vor der Untersuchung reichlich klare Flüssigkeiten z.B. gesüßter Tee aller Sorten, klare Fruchtsäfte ohne Fruchtfleisch, Mineralwasser ohne Kohlensäure. Trinken Sie bitte keine Milch, keine Cola, keine roten Säfte und am Untersuchungstag keinen Kaffee.

Am Tag vor der Untersuchung

Frühstück: – bis 10 Uhr:

1 Brötchen oder Weißbrot zusammen mit Kaffee oder Tee

Mittag: – bis 12 Uhr:

eine leichte Suppe, Brühe, Kartoffelbrei mit Soße (kein Fleisch, kein Gemüse)

Danach darf bis zur Untersuchung keine feste Nahrung mehr gegessen werden. Sie können aber reichlich klare Flüssigkeit trinken!

15 Uhr:

Lösen Sie sich eine Packung MOVIPREP (Beutel A+B) in einem Liter lauwarmen Wasser auf. Trinken Sie die zubereitete gekühlte Lösung innerhalb von 60 Minuten aus.

Bis 18 Uhr bitte weitere 1 – 2 Liter frei gewählte klare Flüssigkeit zusätzlich trinken.



Am Untersuchungstag

Nehmen Sie an diesem Tag keine Nahrung und keine dunklen Getränke zu sich.

 Uhr:

Lösen Sie sich wieder 2 Beutel MOVIPREP in 1 Liter lauwarmen Wasser auf und trinken Sie diesen innerhalb von 60 Minuten aus. Danach bitte noch mindestens 1 Liter klare Flüssigkeit zusätzlich trinken.

Die ausgeschiedene Flüssigkeit, nach Beendigung des Abführens, sollte klar sein (wie Kamillente.) Ist dies nicht der Fall, muss weiterhin Flüssigkeit getrunken werden. Sie sollten jedoch 1 Stunde bevor Sie zu uns fahren mit dem Trinken aufhören, dann hört der Spüleffekt auf.

Sollte das Abführen nicht zur erwünschten Darmreinigung führen, bitten wir telefonisch mit der Praxis Kontakt aufzunehmen.

Sollten Sie Eisenpräparate nehmen, setzen Sie diese 3 Tage zuvor ab. Die Handhabung der Einnahme oder das Absetzen weiterer Medikamente (z. B. blutverdünnende Medikamente) erfolgt nach Absprache mit dem Arzt.

Sie bekommen ein Beruhigungs- und Schlafmittel während der Untersuchung. Bitte beachten Sie, dass Sie deshalb im Anschluss an die Untersuchung, auch aus rechtlichen Gründen, 12 Stunden nicht selbst Auto fahren dürfen und deswegen abgeholt werden müssen.

Bitte informieren Sie Ihre Abholperson, dass Sie **in der Praxis** abgeholt werden müssen.